

5-1062


15

18,519/B

L. 88. 27.


9 D (26) 19929

18/3/20




Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30525846>



ICONES PLANTARUM
Quaquâ-versum, præsertim.
exINDIIS COLLECTARUM,
QUAS exactissimè descripsit
C.COMMELINUS, Botanicus
& Medicine Proff. P.



LUGDUNI BATAVORUM.
Apud IOHANNEM du VIVIE 1716.



CASPARI COMMELIN M. D.

BOTANICES PROFESSORIS, ET ACADEMIÆ CÆSAREÆ

Naturæ Curiosorum Collegæ

HORTI MEDICI

AMSTELÆDAMENSIS

PLANTÆ

RARIORES ET EXOTICÆ

Ad vivum æri incisæ.



LUGDUNI BATAVORUM,

Apud JOH: DU VIVIE, MDCCXV.

LECTORI BOTANOPHILO

S. D. P.

CASPARUS COMMELIN.

Prodierunt nuperrime prælu-
dia mea botanica una cum
iconibus & descriptionibus
plantarum rariorum & exo-
ticarum in præludiis recensitarum, re-
stabant plurimæ in Horto Medico, &
interim multæ accefferunt, quarum ali-
quas nunc una cum iconibus tibi, Lector
Botanophile, exhibere volui, iconibus
* 3 ad

ad eandem cum iis, quæ post præludia habentur, magnitudinem æri incis, ut uterque liber vel conjungi vel separatim servari queat.

Ea est in Horto Amstelædameni publico plantarum rariorum & exoticarum copia, ut novam semper suppetat ignotas describendi materiam, undique enim & continue nova semina, novæ afferuntur plantæ, uterque Orbis & Africa novas ignotasque plantarum quotidie largiuntur species, quibus contemplandis Botanophylus si non satiari, saltem ingenium suum excolere possit. Utriusque Orbis aut Africæ sunt semina, quæ plantas has descriptas produxerunt, ex Africa enim à Nobiliss. Promontorii Bonæ Spei Governatore D: Wilhelmo Adriano van der Stel quotannis Nobiliss. & Amplissimis Horti Medici Curatoribus D.

D. Francisco de Vroede Viro Confu-
lari, & D. Gerbrando Pancras Confuli
mittuntur femina, inter quæ nova nec
visa aliis semper inveniuntur, hæc
causa est, quod inter eas, quas hacte-
nus descripsi & nunc descriptas exhi-
beo, plantas rariores, Africanarum
semper numerus sit maximus; inter
Aloes, quarum species præteri-
ta æstate in Horto Medico de-
monstravi quadraginta & octo,
triginta & tres Africanæ numerantur,
quæ omnes læte in Horto Medico vi-
gent, & quarum species septendecim
omnino floruerunt, harum aliquæ sin-
gulis annis semel dumtaxat, aliæ nul-
lo servato tempore bis terve quotan-
nis floribus suis aspectu jucundissi-
mis hortum exornant, Botanophilos
sua jucunditate perfundunt & ve-
hementer delectant: quamdiu exo-
tica

2
ticarum rariorumque plantarum nu-
merus in horto crescit, & D. O.
M. mihi vitam sanitatemque largi-
tur, eas tibi L. B. negabo nunquam.
Vale.

Dabam Amstelædami

VI. Idus Januarii MDCCVI.

Spiræa

Spiræa Africana foliis cruciatim positis.

EX radice lignosa caulis prodit rotundus, tenuis & fuscus, qui vix pedem altus in varios divaricatur ramos, primo virides & tenues, dein fuscos & lignosos, ramulis cruciatim folia nullo sustenta pediculo adstant parva, angusta & viridia, hi ramuli singulis annis in alios dividuntur, quorum cacumina flores ornant rosacei & albicantes, in quibus stamina apparent in luteos apices exeuntia, flore evanescente pistillum, quod ex calyce surgit, in fructum mutatur è quinque siliquis subviridibus & simul junctis compositum, quæ semen continent oblongum, quod cum nigredine splendet. Hæc cum tertia specie certum in horto publico florendi tempus habet nullum, florent enim nunc vere, nunc æstate, autumno & aliquando ipsa hyeme. Semina hujus cum sequentium duorum fruticum seminibus ex illa Africæ parte, quæ Promontorium Bonæ Spei audit, *Hyperici Africani frutescentis* nomine mittuntur, quo nomine etiam in codice Nobiliss. & Ampliss. Consulis Nicolai Witsen duæ sequentes Spirææ depictæ exhibentur.

A

Spiræa

2 C. COMMELIN PLANTARUM

*Spiræa Africana odorata, floribus suave
rubentibus.*

R Adices habet etiam hæc Spiræa lignofas, è quibus caulis producit lignofus & fuscus, qui præcedente paulo crassior, humilios tamen, in varios & plures divitur ramulos, folia ejusdem cum præcedente sunt longitudinis, sed paulo latiora, nullo intermedio pediculo annectuntur ramulis, ad unum omnia odorem spirant penetrantissimum, in ramulorum cacumine flores apparent pulcerrimi, qui magna cum amœnitate suave rubent, & odorem ut folia emittunt fragrantissimum, in florum medio stamina videntur, quorum apices rubescunt, siliquæ subrubentes quinque florem evanidum sequuntur, quæ ut in aliis speciebus simul junctæ sunt & in singulis semen nigrum & splendens continent. In Horto Medico singulis annis verno tempore floret, in Africa autem (ut codex habet Nobiliss: & Ampliss: Consul D: D: Nicolai Witsen) floret Octobri, & locis invenitur altioribus juxta montes sitis.

Spiræa

Spiræa Africana odorata foliis pilosis.

C Rassiorem altioreque caudicem eumque fuscum radices lignosæ producunt, in varios etiam divaricatur ramos hujus Spirææ caudex, virides primo & pilosos, dein fuscos & glabros, ramuli nullo habito ordine foliis vestiuntur angustioribus & maxime pilosis; flores, qui ramulorum cacumina exornant, albent, staminum apices flavent, pistillum in siliquas abit quinque simul junctas & virides, quarum singulæ semen includunt nigrum & splendens, hoc tamen proprie habet hæc Spiræa, quod apparentibus siliquis flores tamen non decidant, nisi siliquæ cum seminibus maturuerint: flores & folia odorem spirant fragrantem, sed minus acutum quam præcedentis folia & flores. Incolæ Promontorii Bonæ Spei, qui *Hottentotti* dicuntur, foliorum hujus Spirææ magnam colligunt quantitatem, quibus siccatis caput & vestes odoris & ornamenti causa conspergunt: locis iisdem cum præcedente crescit, & floret Septembri, ut notatur in codice Witfiano.

Melianthus Africanus minor fœtidus.

TRium quatuorve pedum altitudinem habet hic Melianthus, caulis rotundus & simplex in ramos dividitur, folia, quæ hos ambiunt, conjugata sunt, & medio nervo alato ex adverso adhærent bina, uno impari extremitatem claudente, profunde per ambitum ferrata sunt omnia, parte superiore herbaceo virent colore, inferiore albicant: ex foliorum alis pediculus exsurgit, qui racematim flores septem octove ex parvis petiolis dependentes sustinent, quibus singulis foliolum subjicitur viride, ut in vulgari Meliantho, hi flores anomali sunt, qui è quatuor petalis croceis constant, simulque junctæ flabelli instar dependent; calyx inæqualiter trifariam dividitur, qui liquorem continet nigricantem & dulcem, stamina quatuor in luteos apices terminantur, pistillum in fructum excrescit membranaceum in quatuor loculamenta divisum, quæ semina continent rotunda & nigra; certum florendi tempus observat nullum, nam quovis floret.

*Jasminum Africanum foliis solitariis floribus
vulgatiori similibus.*

R Adices lignosæ arbusculam proferunt quin-
que pedes altam totamque viridem, caulem
habet hoc Jasminum rotundum & viridem, ex
foliorum alis rami proveniunt, folia viridia sunt;
parvo sustentantur pediculo, & in acumen exeunt,
in ramulorum cacumine tres plerumque apparent
gemmæ oblongæ, quæ è purpureo & albo colore
rubent, & tandem in florem excrescunt monopeta-
lum infundibuliformem, qui plerumque in quinque
rarissime sex (ut in appiçto flore) dividitur seg-
menta, intus albent omnes, foris punicant, &
odorem spirant fragrantem; fructum hætenus in
Horto Medico produxit nullum, ex bacca tamen
unico semine foeta provenit Jasminum hoc, quod
æstivo tempore floret.

*Jasminum Africanum ilicis folio, flore
solitario, ex foliorum alis proveniente, albo.*

CAulem scabrum, inæqualem, rotundum & fuscum habet hæc nova Jasmini species, humanam altitudinem sæpe superat, in varios dividitur ramos, qui cum caule infirmi & fragiles sunt, ramulis folia absque ullo pediculo annectuntur numerosa, acuminata, lata, rigida, hirsuta, & per ambitrum serrata, quo junior planta, quo majora & latiora folia sunt, quo annosior, eo ipsa minora; ex foliorum alis in perianthio quinquifido flos exsurgit monopetalus, albus, quinquifidus & infundibuliformis, cujus pistillum in baccam abit primo viridem & per maturitatem nigram, unico rotundo semine foetam; flores odorem spirant, ut vulgatiore, fragrantem. Locis humidis in Promontorio Bonæ Spei reperitur, & Septembri floret, ut notat Codex Witsianus; in Amstelædamensi horto quocunque anni tempore floret.

*Ketmia Africana vesicaria uvæ crispæ foliis,
flore spirali sulphureo.*

Caulis rotundus, ruber & inæqualis est, in ramulos varios divaricatur; raro integra arbuscula quinque pedum altitudinem superat: folia parvo pediculo ramulis annectuntur, maxime virent & in plures lacinias dividuntur, ex foliorum alis pediculi oriuntur digito longiores, ex quorum summitate in calyce quinquifido flores dependent pentapetali sulphurei, quorum petala in spiram contorta sunt omnia, fructus, qui florem sequitur, in calyce vesicario absconditur, in quinque loculamenta dividitur semina parva continentia: prima æstate in horto Amstelædamensi floret, rarissime semina perficit.

Centaurium minus Africanum arborescens

latifolium flore ruberrimo.

Idem Angustifolium.

Utrumque hoc *Centaurium minus* caulem habet rotundum, viridem, foliorum stygmata, quibus junior caulis ornabatur, per ætatem retinentem, varios emittit hic caulis ramulos, quibus undique folia adstant in una specie alterius foliis paulo latiora, tamen angusta satis in illa specie, quæ respectu alterius *Latifolium Centaurium* dicitur, longitudinem si respiciamus, habent enim maximam affinitatem cum foliis *dracunculi hortensis*, sed viridiora sunt magisque splendent, utriusque ramulorum cacumina floribus ornantur ruberrimis, qui infundibuliformes sunt & pentapetaloidei, cujus tamen folia angustiora sunt, florem aliquando habet hexapetaloideum; fructus, qui utriusque florem sequitur, rotundus est, in duo dividitur loculamenta & parva semina continet: utraque species per integram floret ætatem.

Cen.

Centaurium minus Africanum arborescens
pulpiferum.

Aliam etiam Centaurii minoris arborescentis speciem alit hortus Amstelædamensis, cujus rami sunt copiosiores & in plures minores dividuntur, caulem habet rotundum sed præcedente lignosiore, foliorum stygmata etiam reservantem, folia breviora & angustiora sunt, cum foliis Centaurii lini foliis & facie, flore amplo suave rubente capitis Bonæ Spei Breyn: Prod: 2. conveniunt, quod Rapuntii affinis nomine in Centuria prima pag: 175. descriptum delineatumque Breynius exhibet: ramulorum cacumina flores exornant monopetali infundibuliformes & quinquefarium divisi, rubicundi, & floribus præcedentis quadruplo minores, flores fructus sequuntur oblongo rotundi, molles & pulpam continentes, qui semina parva includunt; quocunque ferme anni tempore flores gerit & fructus.

*Fabago Africana arborescens flore sulphureo,
fructu rotundo.*

HUjus Fabaginis Africanæ arborescentis ramorum & caulix cortex exterior scaber & inæqualis, interior autem viridis est, planta integra trium quatorve pedum altitudinem habet, folia gemina absque ullo pediculo ex eadem sede provenientes totidem sibi habent opposita, quæ parva sunt, viridia & crassa, ex foliorum alis pediculi oriuntur parvi & virides, qui in calyce quinquifido florem sustinet unicum pentapetalum seu rosaceum & luteum, in cuius medio stamina videntur multa ejusdem coloris, florem fructus sequitur rotundus, casei instar compressus, quinque capsularis totidem semina plana continens. In horto Amstelædamensi media floret æstate, & hyeme semina perficit. In Africa etiam, ut notat Codex Witsianus, augusto floret, locisque crescit apricis.

Colutea

*Colutea Africana, senna foliis, flore**sanguineo.*

Altitudinem habet hæc Colutea ferme humanam, caulis vix digito crassior est, qui in varios ramulos dividitur, folia per conjugationes costæ innascuntur parva & viridia, in ramulorum cacumine ex foliorum alis pediculi digito longiores proveniunt, qui in minores divisi flores sustinent papilionaceos rubros, quorum vexillum macula notatur lutea, ex cujus calyce pistillum surgit, quod in capsulam excrescit membranaceam, crassam, fuscam & vesicariam, quæ semina subnigra & reniformia continet. Media floret æstate & autumno semina perficit.

Colutea Africana humilis, flore sanguineo,

Crotolaria siliquis.

Rotundi & herbacei cauliculi singulis annis ex radice perenni & vivaci proveniunt, quibus undique folia adnascuntur conjugata, angusta & viridia, ex foliorum alis, quæ in cauliculorum extremitatibus nascuntur, in pediculo rotundo & viridi flores crescunt ruberrimi papilionacei, quorum pistillum in siliquam abit oblongam vesicæ instar inflatam, quæ siliqua ejusdem est magnitudinis & figuræ ac siliqua *Crotolaria Asiaticæ* folio singulari verrucoso, floribus cæruleis Horti Lugd: Batav: , & in his semina congenerum more crescunt reniformia, fructibus maturis cauliculi exarescunt omnes, radice vivaci duntaxat superstite futuro anno novos cauliculos productura.

Cytisus

Cytisus Africanus herbaceus floribus rubris.

CAulis, qui ex radice perenni & nonnihil lignosa provenit, statim in varios dividitur ramulos, rotundos, tenues, pilosos & herbaceos, quibus uno sustenta pediculo folia adnascuntur terna & viridia, ramulorum cacumina terminantur in pediculum sesqui digito longiorem, qui spicatim flores profert multos, rubros & papilionaceos, fructus, qui flores sequuntur, oblongæ sunt siliquæ, planæ & quasi articulatæ, articulatæ enim revera non sunt, quum maturæ per longitudinem sua sponte aperiantur, semina in his continentur oblonga; prima æstate floret hic Cytisus, & autumnio semina perficit.

Lilio-Asphodelus Americanus sempervirens
maximus, polyanthus albus.

A Bruno capite pulcerrimæ hujus plantæ de-
 pendent radices albicantes & crassæ, trun-
 cus rotundus, qui ex his provenit, brachii crassi-
 tiem habet, fungosus est, & ex albo flavescit,
 quem foliorum deciduorum reliquæ inæqualem &
 tunicatum reddunt, hujus cacumen foliis compo-
 nitur tribus pedibus longioribus, quæ ex duarum
 unciarum basi inventrem quinque uncias latum ex-
 crescunt, & in mucronem terminantur, intus
 nonnihil excavantur, foris elevantur, media æsta-
 te ex horum medio scapus erigitur tres pedes al-
 tus, qui multos & ex una sede provenientes sus-
 tinet flores albicantes inferius tubulatos, supe-
 rius in sex partes divisos, è quorum medio sex
 stamina egrediuntur, horum apices transversim
 incumbunt & lutei sunt, fructum hætenus in
 Horto Medico produxit nullum.

Lilio-Asphodelus Americanus sempervirens
minor albus.

UT in præcedente ita & in hac specie ex uno capite multæ dependent radices albæ & crassæ, quarum extremitates superiora versus reflectuntur, & è terra provenientes novam sobolem producant, hujus truncus præcedentis trunculo convenit, sed quadruplo tenuior & humilior est, folia triplo sunt angustiora & duos pedes longa, circa horum initium media quoque æstate scapus excrescit, qui flores producit plerumque quatuor tubulatos, albos & in sex partes æquales divisos, stamina horum apices luteos habent transversim incumbentes.

Apocynum

Apocynum Africanum lapati folio.

Radicem habet crassam, albam & perennem, ex qua singulis annis primo vere duo tresve cauliculi proveniunt crassi, rotundi & virides, quibus folia ex adverso bina, nullo interveniente pediculo, adstant undulata, viridia, vix spithamam longa, per quorum medium nervus excurrit crassus & albicans, in cauliculorum cacumine multi apparent flosculi virides, monopetali & quinquefidi, quorum margines pilis albicantibus eleganter fimbriatæ sunt, in horum meditullio capitulum apparet, quod quinquefariam dividitur, hi flores omnes ipso autumno, nullo hæcenus secuto fructu, pereunt: ex quavis parte læsa lac fluit copiosum.

*Apocynum erectum Africanum subhirsutum**foliis undulatis Parad: Bat.*

HOC Apocynum pagina vigesima quinta Paradisi Batavi a Cl: Hermanno nulla adjuncta icone describitur, quare ejus descriptionem additis addendis sequar; crescit in monte petroso vulgo *Steenbergh* ad Promontorium Bonæ Spei, tres quatuorve cauliculi ex eadem radice proveniunt, duos tresve pedes alti, virides, aliquomodo lanuginosi, qui calami anserini crassitiem habent, folia digitum longa in mucronem terminantur, ex adverso bina parvo sustenta pediculo cauliculis adnascuntur, & ad margines sinuata undulataque sunt omnia: flores umbellatim positi cauliculorum cacumen ornant, ex viridi flavescent, monopetali sunt, campaniformes, inversi & multifidi, horum capitula ex quinque in orbem positis componuntur corniculis, semina hætenus in orto Medico matura produxit nulla.

Apocynum scandens Africanum Vinca per-
vinca foliis subincanum. Parad. Batav.

EX radicibus reptatricibus cauliculi plurimi,
 & nisi sustentantur humi fusi, proveniunt,
 folia ex adverso bina parvis pediculis annectun-
 tur, *Vinca pervinca* figuram habent, sed minora
 sunt, & senili quasi canitie albescunt, ex folio-
 rum alis media æstate parvi oriuntur petioli, qui
 septem octove sustinent flores monopetalos, mul-
 tifidos & inversos, quorum petala rubent, capi-
 tula albicant. Hactenus in Horto Medico fructus
 produxit nullos. Ex quavis læsa parte humor
 fluit lacteus.

Asclepias

*Asclepias Africana aizoides flore pulcre
fimbriato.*

EX tenuibus fibrosisque radicibus cauliculi
proveniunt quadrangulares, denticulati &
virides, qui oblique eriguntur, facile in alios divi-
duntur, & spithama longiores sunt, ex foliorum in-
cisura quocumque anni tempore pediculus excres-
cit sesqui digito longior, qui in calyce quinqu-
fido florem fert monopetalum, quinquifidum &
coriaceum, foris flos viret, intus extremitates &
margines petalorum rubent, pars media viridis li-
neis transversis & rubentibus notatur, capitulum,
quod floris medium occupat, stellæ instar dividi-
tur & rubet, cæterum flos integer fimbriis ruben-
tibus & sericeis intus pulcerrime ornatur. Locis
saxosis ad rivulorum margines crescit, & Octobri
in Promontorio Bonæ Spei floret, ut in Codice
Nobiliss: & Ampliss: Consulis D: D: Nicolai
Witsen notatur.

Arum Americanum colocasia folio maculatum,
cauliculis fuscis.

Idem Cauliculis viridibus.

Habet utrumque Arum subrotundam, inæ-
 qualem & nigricantem radicem, ex cujus
 parte suprema multæ & albicantes interiora ver-
 sus producuntur fibræ, ex his cauliculi eriguntur
 spithama nonnumquam longiores, in una specie
 virides, in altera fusci, in utraque tamen cum
 albedine nonnihil variegantur, quorum quisque fo-
 lium sustinet umbilicatum instar foliorum *Coloca-*
sia Ægyptiacæ, sed in utraque specie folia ma-
 culis sanguineis figuræ & magnitudinis indetermi-
 natæ notantur: anno hujus seculi quarto species
 cauliculis viridibus scapum ex ipsa radice produxit
 foliis altiore, qui florem sustinuit monopetalum
 & anomalum ex albo viridem, qui pistillum em-
 bryonibus stipatum intus continebat, quorum
 nullus baccam produxit maturam: per integram
 æstatem viret utraque species, hyeme radices
 omni folio viduæ, siccatae in hybernaculis servan-
 dæ sunt.

Quam.

*Quamoclit Americana hederæ folio flore**Coccineo.*

TEnues & virides cauliculi, qui ex tenui & albicante radice proveniunt; perticas appositas circumvolvendo amplectuntur, in longis pediculis folia habent instar hederæ arboreæ, quæ ab una parte virescunt, ab altera cæsi sunt coloris, ex horum alis flosculi longis sustenti petiolis nascuntur, qui monopetali infundibuliformes & quinquefidi colorem habent coccineum; fructus, qui florem sequitur, subrotundus est, & semina nigricantia continet; media floret æstate, autumnò semina perficit.

*Momordica Americana fructu reticulato**sicco.*

EX fibrosa & parva radice sarmenta proveniunt tenuia, viridia & rotunda, his ab uno latere in pediculis sæpe digito longioribus folia nascuntur vitis foliis similia, ab altero latere claviculæ oriuntur, quarum ope perticis appositis adhærent, ex foliorum alis flosculi communi petiolo sustenti proveniunt lutei, & monopetali, qui profunde admodum secantur, ut pentapetali videantur, quorum alii steriles nullo adhærent embryoni, alii fœcundi embryoni insident, qui tandem in fructum excrefcit oblongum, turbatum & echinatum, hic per maturitatem fungosus & retis instar perforatus est, in quo semina continentur oblonga, plana & nigricantia.

Cotyledon

*Cotyledon Africana frutescens, folio longo &
angusto, flore flavescente.*

L Ocis saxosis ad Promontorium Bonæ Spei
crescit hæc Cotyledon, in his regionibus
quavis avulsus ramulus in terram vere aut æstate
depactus facile radices agit, læteque crescit, cau-
lis rotundus brevis & viridis statim in ramulos di-
viditur, qui folia gerit digitum longa, crassa,
succulenta & viridia, quorum cacumina nunc ru-
bent, nunc virescunt, ramuli tandem excrescunt
in scapum aliquando sesqui pede longiorem, qui
in varios pediculos dividitur, è quibus in calyce
quinq̃uifido flores dependent monopetali, tubulati,
flavescentes & quinq̃uifidi, horum oræ sursum re-
flectuntur, & nonnihil rubent, stamina apicibus
luteis prædita e flore dependent, fructus ex di-
versis constat vaginulis, semine foetis exiguo.

Cotyledon

Cotyledon Africana frutescens flore umbellato

Coccineo.

TRuncum habet hæc Cotyledon rotundum, rubentem & quasi geniculatum, qui in ramos dividitur, quos folia ex adverso bina ita amplectuntur, ut a ramulis transfadigi videantur, hæc succulenta, lata, mucronata & pauca hirsutie fimbriata sunt, ramulorum cacumina pulcerissime ornantur floribus numerosis, coccineis, & umbellatim positis, & erectis, qui omnes monopetali, tubulati & quinquifidi sunt, & in calyce quinquifido & succulento nascuntur, fructus è variis vaginulis componitur semine minutissimo foetis: per integram floret æstatem, ex avulso ramulo in terram depacto facillime propagatur, cum ilico radices agat.

*Teucrium Orientale angustifolium laciniatum**flore magno subcœruleo Tourn: Corall: instit.*

EX radice varii exsurgunt cauliculi, quorum tenuiores humi fusi cacumen tamen erigunt, crassiores & vegetiores statim a radice eriguntur, & quadrangulares sunt, quibus folia adstant ex adverso bina, quæ multiplici incisura dividuntur, ex foliorum alis, præsertim in caulium cacumine pediculi oriuntur, qui spicatum flores gerunt numerosos, hi monopetali, ex adverso proprio sustentanti pediculo bini, labiati & subcœrulei sunt, superioris labii seu galeæ locum occupant stamina, quæ apices habent cœruleos, labium inferius quinquefariam dividitur, pars inferior cæteris major excavatur, semina in perianthio florem evanidum sequuntur quatuor.

Lanium Orientale foliis eleganter laciniatis

Tournef: Corall: instit:

EX una eademque radice varii & simul proveniunt cauliculi quadrangulares & firmi, qui etiam in alios quasi ramos dividuntur, his folia adstant viridia, nervosa & eleganter laciniata, ab imâ parte ad cacumen usque secundum folia verticillatim cauliculos flores ambiunt monopetali, labiati & galeati, cujus galea cochlearis instar excavatur, labium cordiforme est & bifariam dividitur, rubent eleganter omnes, & fimbriis galea pulcerrime ornatur, semina quatuor in floris calyce maturescunt.

Lavandula folio longiore tenuius & elegantius

dissecto Tournef. Corall: inst:

F Rutescit hæc cariensis species lavendulæ, cauliculi & rami qui juniores virent, hirsuti & quadrangulares sunt, lignosi tandem, fusci, & rotundi evadunt, folia digitum aliquando longa multifida tenuiterque incisa cauliculos ambiunt, lanuginosa & cinerei coloris, ramulorum cacumina terminantur in virgulas quadrangulares nudas & lanuginosas, quæ inspicia nunc simplici nunc duabus tribusve simul junctis flores sustinent cœruleos, monopetalos, labiatis & galeatos, galea erecta bifariam, labium autem trifariam dividitur: facile ex semine deciduo, quod singulis annis maturum in horto Medico profert, propagatur.

*Moldavica Orientalis Betonica folio, flore
magno violaceo Tournef. Corall. instit. II.*

HÆc Moldavica, quæ singulis annis matura profert semina, caulem habet quadrangularem, qui etiam in ramulos quadrangulares dividitur, quibus ex adverso folia adstant bina, oblonga, viridia, nervosa & ferrata, in foliorum alis parva alia etiam apparent foliola & quasi aculeata, his etiam in calyce tubulato adsunt flores monopetali galeati & labiati, magni, colorisque violacei, galea sursum reflectitur & bifariam ut labium dividitur, semina quatuor in utriculo seu calyce aperto flores sequuntur matura.

Moldavica

Moldavica Orientalis minima ocymi folio,

flore purpurascente Tournef. Corall: inst: I I.

Vix pedem alta est hæc Moldavica, caulis & ramuli quadrangulares folia ex adverso bina oblongo rotunda, nervosa & nonnihil pilosa sunt, ex foliorum alis in calycibus tubulatis verticillatim flores crescunt numerosi, parvi, purpurascentes labiati & galeati, galea ut in cæteris speciebus reflectitur & bifariam cum labio dividitur, foliola etiam quasi acculeata ut in præcedente specie secundum folia reperiuntur, semina quoque quatuor flores singulos sequuntur. Semina plantarum Orientalium, quarum nunc & icones & descriptiones exhibeo, mecum communicarunt Clarissimi Viri Josephus Pitton Tournefort D: M: Parisiensis, Academiae Regiæ scientiarum socius & in horto Regio Botanices Professor, & Andreas Gundelsheimerus, M: D: invictissimæ Borussiæ Majestatis Regiæ Consiliarius & Archia-
ter.

Cassida Orientalis incana foliis laciniatis flore

luteo Tourn: Corall: instit:

EX radice perenni cauliculi producuntur numerosi, qui humi serpunt omnes & facile agunt radices, novamque plantam constituunt, his folia adnascuntur oblonga & cinerei coloris, quorum utraque margo profunde inciditur, circa cauliculorum extremitatem in pediculis flores apparent lutei, labiati & galeati, galea duabus instructa est auriculis, labium bifariam dividitur, calyx flore decidente tandem excrescit & operculo tegitur galeam referente, quod in nullis verticillatarum generibus fieri solet, quare Cassidam hoc genus Fabius Columna vocavit, semina quatuor in calycibus galeato operculo tectis inveniuntur.

Cynoglossum Orientale Buglossi folio fructu

umbilicato cristato Tournef: Corall: inst.

Singulis annis ex fatis semine hoc Cynoglossum propagandum, quod caulem habet rotundum & in varios statim ab ipsa radice divaricatur ramos, quibus undique folia adstant oblonga, angusta & mucronata, ramulorum cacumina in longos terminantur pediculos, qui in parvis petiolis flores ex luteo rubentes sustinent monopetalos, infundibuliformes & multifidos, quorum pistillum in fructus mutatur quatuor oblongo rotundos, planos, umbilicatos & cristatos.

*Linaria Orientalis, lilii persicifoliis, florum
spica densissima & pyramidata Tourn: Corall: inst: 9.*

PUlcerrimam hanc Linariæ speciem mecum
commuicavit Vir Doctiss: Andreas Gundels-
heimerus seu potius ejus semina anno 1703, ad al-
titudinem quatuor pedum excrevit, caulis erat
rotundus, in varios dividebatur ramulos, his
absque ullo pediculo adhærebant folia quatuor
quinqueve unciis aliquando longiora uncia latio-
ra, acuminata & glauca, ramuli omnes termina-
bantur in spicam longam, cui densissime hærebant
flores lutei magni, monopetali & anomali, quo-
rum pars postica in caudam desinebat, anterior
in duo labia ut in cæteris speciebus dividebatur.

Lysima

*Lysimachia Orientalis angustifolia flore purpureo**Journes: Corall: instit:*

TRes quatuorve ex eadem radice fibrosa cauliculi proveniunt alati, quibus folia viridia undique & copiose adstant, quæ tres uncias longa ex basi angustiore in ventrem triplo latiorem excrescunt & in mucronem terminantur, per horum medium nervus unicus tendit, caules omnes in spicam terminantur pede longiorem, aliæ etiam laterales spicæ ex foliorum alis oriuntur, quæ quo caulium cacumini propinquiores eo ipso longiores sunt, quæ omnes floribus ornantur purpureis & numerosis, monopetali sunt omnes, multifidi, exigui & raro patuli; floruit secundo sationis anno, & semina priusquam produxit matura, periit.

Papaver Orientale hirsutissimum, flore magno,

Tournef. Corall. instit.

P Erennat radix hujus Papaveris, ex qua singulis annis folia in longo & hirsuto pediculo producuntur longa & lata, quæ omnia in lacinias iterum laciniatas dividuntur, nervus per foliorum & laciniarum longitudinem excurrit crassus, ab utraque parte folia sunt hirsutissima, ex eadem radice pediculi etiam oriuntur rotundi, hirsuti, tres quatuorve pedes alti, quibus undique folia adstant, prioribus similia, pediculi hi terminantur in florem ruberrimum & pentapetalum, stamina nigricantia capitulum medium ambiunt, fructus oblongus capitello ornatur & semina minutissima continet.

*Anemonospermos Africana foliis plantaginis**flore sulphureo.*

Multa ex eadem radice fibrosa & perenni
 proveniunt folia, lata, nervosa & ferrata,
 hæc pediculis sustentantur longis, ab una parte
 planis ab altera convexis: surgunt etiam ex ea-
 dem radice pediculi rotundi, sesqui pede longiores,
 quorum cacumina in calyce squamoso terminantur,
 florem ferunt discoidem radiatum, radiorum petala
 lata & sulphurea sunt, quæ discum constituunt,
 ex atro rubent; semina oblonga tomento invol-
 vuntur. Cæterum folia, florum foliorumque pe-
 diculi, hirsutissima sunt omnia, per integram floret
 æstatem.

Anemonospermos Africana jacobaeae maritima

foliis, flore sulphureo.

Cauliculus statim ac ex ipsa radice produci-
tur folia emittit plurima, quæ multiplicibus
eisque profundis laciniis dividuntur & in mucro-
nem terminantur, tandem cauliculus in pediculos
dividitur & terminatur sesqui pede longiores,
qui in capitulum exeunt squamosum, quod tan-
dem florem profert discoideum radiatum, quo-
rum petala radium constituentia ut in præceden-
te sulphurea, sed angustiora, flores, quibus discus
componitur, ex atro quoque rubent, semina in
tomentosis capitulis maturescunt; glauca sunt &
quasi senili canitie folia & pediculi obducuntur,
media floret æstate.

Elichrysum Africanum tomentosum frutescens

calyce argenteo.

EX radice lignosa caulis provenit rotundus, crassus & fuscus, qui in ramos divaricatur, quibus undique folia adhærent unciam longa, angusta & mucronata, quæ una cum ramulis ita sericis & quasi argenteis pilis obducuntur & ornantur, ut tota quasi ex argento & serico confecta videantur, ramulorum cacumina ornantur capitulis squamosis & argenteis, quæ calycem constituunt, in quo multi stellæ instar divisi videntur flosculi, quos semina sequuntur pappo instructa, per avulsum ramulum in terram depactum, & semina primo vere propagari debet.

Elichrysum Africanum tomentosum frutescens

floris calyce aureo.

Rigidiores quam in præcedente, & minus flexiles sunt hujus Elichrysi ramuli, faciem, præterquam quod folia triplo sunt minora & rigidiora, habet eandem, pilis enim etiam sericis quasi & argenteis tota planta exornatur, ut si disjunctæ omnique flore viduæ videantur, nisi quis foliorum magnitudinis meminerit, eamque cum ramulorum rigiditate respexerit, facile in alterutra eligenda & nominanda falli posset: ramuli hujus in capitula terminantur, aurea & squamata, quæ calycem constituunt, & flosculos plurimos producant, semina in pappum terminantur, utraque species primo vere flores producit, autumno semina perficit.

Centaurium majus Orientale erectum, glastis

folio, flore luteo Tourn: Corall: instit.

EX vivaci & superstitie radice primo vere folia prorumpunt longa, lata & cineracia, inter hæc caules proveniunt quatuor pedibus altiores, & alati, quibus folia annectuntur longa, prioribus angustiora, qui caules tandem terminantur in capitula magna squamata & argentea, è quorum cacumine flores multi erumpunt lutei, quos semina pappo instructa sequuntur: hujus semina mecum communicavit vir doctissimus Andreas Gundelsheimerus M: D: Borussia Majestati Regiæ a Consiliis & Archiater.

Senecio

Senecio Africanus arborescens ficoidis folio ES

facie.

SEmina papposa in calyce cylindraceo & multifido, quæ anno hujus seculi secundo Nobilissimus Promontorii Bonæ Spei D: W: Adrianus van der Stel ad Nobilissimos & Amplissimos Horti Medici Curatores misit, plantam hanc produxerunt, quæ duorum annorum spatio altitudinem pedum duodecim superavit, caulem habet crassum & rotundum, cui undique adhærent folia crassa, succulenta & mucronata, ramulorum cacumina in varios terminantur pediculos, qui flores in calyce multiscisso & cylindraceo ferunt multifidos, semina, ut ante dixi, papposa: cæterum glauca est tota planta & rore cæso obducta, truncus in frustra scissus, & in terram depactus ilico radices agit.

Coma

Coma aurea Africana fruticans foliis inferioribus incis, superioribus dentatis.

F Rutescit hæc Coma aurea, quemadmodum & illæ, quas in altera parte hujus horti descriptas exhibui anno hujus seculi primo: caulem habet hæc pedalem, rotundum & fuscum, in varios dividitur ramulos primo virides dein quoque fuscus, his folia adstant duplicia, inferiora nimirum longa & instar foliorum coronopi inciduntur, superiora parva sunt & rigida, in mucronem terminantur posteriora versus flectuntur & utraque margo dentata est, ramulorum cacumina floribus ornantur discoideis non radiatis luteis & umbellatim positis, quos semina sequuntur papposa: primo vere & æstate floret, autumno semina perficit.

Jacobaea Africana frutescens foliis incis &

subtus cineraceis.

AD humanam sæpe altitudinem exsurgit Jacobæa hæc, caulem habet rotundum & pilosum, qui in ramos divaricatur rotundos etiam & pilosos, quibus nullo intermedio pediculo folia annectuntur longa, ferrata & mucronata, quæ superius cum viriditate splendent, subtus quasi cinere obducta nonnihil albescunt, ramulorum cacumina in varios pediculos terminantur, qui flores gerunt discoideos radiatos, luteos, quos semina plurima papposa sequuntur. Per integram floret hæc Jacobæa æstatem, & autumno ejus semina maturefcunt.

Pers-

*Persicaria Orientalis Nicotiana folio Calyce**florum purpureo Tournef: Coroll: Inst:*

SEmina hujus elegantissimæ Persicariæ mecum primo Doctissimi Viri Tournefortius & Gundelsheimerus communicarunt, dein eadem mihi Smyrna misit eruditissimus Sherardus, planta ex iis enata duodecim pedum altitudinem superabat, caulem habet geniculatum, folia longo pediculo caulis genicula amplectuntur, quæ longa lataque in mucronem terminantur, & nervosa sunt, ex foliorum alis pediculi oriuntur, in quos etiam plantæ cacumen dividitur, qui flores gerit racematim cohærentes staminiferos, quorum calyces magna cum amœnitate purpurascunt.

*Aloe Africana caulescens foliis magis glaucis
caulem amplectentibus & in mucronem obtu-
siorem desinentibus.*

ALoen hanc ut & quatuor sequentes prælu-
diorum pagina 68. cum icone descriptas
exhibui, quæ tamen quum editis præludiis in
Horto Medico floruerint easdem cum floribus
proponere & describere volui.

Radix hujus fibrosa, alba & dein fusca est,
caulem habet uncia crassior, quem folia am-
plectuntur glauca, succulenta, oblonga & in
mucronem obtusum exeuntia, qui æque ac folio-
rum latera multis spinis parvis, albicantibus &
fatis rigidis armatur: foliorum succus amarorem
habet ingratum: anno hujus seculi tertio ex plan-
tæ cacumine media æstate scapus prodiit duobus
pedibus altior, rotundus & viridis, cujus cacu-
men floribus multis, purpureis & dependentibus
ornabatur, qui monopetali erant & multifidi.

Aloe

Aloe Africana caulescens, foliis glaucis brevioribus caulem amplectentibus, foliorum parte interna & externa nonnihil spinosa.

EX radicibus rotundis in capillares exeuntibus planta erigitur pede nunc altior, quæ caule sustentatur rotundo & fatis pro plantæ altitudine crasso, folia huic circumstant glauca, rigida, succulenta, duas uncias lata & quinque longiora, quæ in mucronem obtusum ac spinosum terminantur, & spinis in utraque margine albicantibus armantur, in horum prona & supina parte hinc inde maculæ tandem apparent rotundæ & albicantes, quæ sensim eriguntur & in spinas albicantes abeunt, anno 1703. ex summitate scapus prodiit tribus pedibus longior, qui rotundus & fuscus, foliolis paululum a se invicem distantibus vestitur, & in longiori spica floribus ornatur primo viridibus, dein ex rubro purpurascentibus, monopetalis & multifidis.

*Aloe Africana humilis spinis inermibus &
verrucis obsita.*

R Adices hujus Aloes fibrosæ sunt & albicant, è quibus folia producuntur multa, quatuor uncias longa, succulenta & glauca, quæ ab utraque parte verrucis & spinis inermibus, hoc est, vix pungentibus, obducuntur, & in mucronem versus plantæ medium reflexum exeunt: singulis annis bis è plantæ medio nunc simplex, nunc geminus exit scapus rotundus, & viridis, cui undique parva & mucronata adhærent foliola, & cujus cacumen sesqui pede nonnunquam altius flores exornant monopetali & multifidi, qui rubent extremitate virescente. Succus hujus Aloes saporem exhibet primo nonnihil amaricantem, sed mox dulcem.

Aloe

*Aloe Africana humilis foliis ex albo & viridi
variegatis.*

RAdix huic plantæ alba multisque prædita
est geniculis, facile novas plantas produ-
cens, ex his folia producuntur quatuor unciis
longiora, succulenta, crassa, rigida & in acumen
triangularem exeuntia, ubique hæc folia viridia
maculis nunc parvis, nunc magnis & albicantibus
notantur, foliorum margines & dorsum linea al-
bicante & scabra obducuntur: è foliorum medio
scapus exit rotundus & maculatus, è cuius cacu-
mine flores aliquot dependent rubri, monopeta-
li & multifidi: foliorum succus subdulcis.

Aloe

*Aloe Africana humilis folio in summitate
triangulari & rigidissimo, marginibus albicantibus.*

Folia aliquot in orbem posita radice sustentantur albicante & fibrosa, quæ folia viridia, rigidissima & crassa sunt, trium unciarum longitudinem, sesqui latitudinem habent, in summitatem mucronatam & triangularem exeunt, & utraque margine albicant: scapus rotundus tenuis & longus in quinque pediculos dividitur, qui flores sustinent monopetalos multifidos, hi omnes intus albicant, extus virent. Succus hujus Aloes insipidus & aquosus est.

F I N I S.

Sub. mass. 2

81 lbs

81 lbs

cp

4

2 weeks in 1883

a.

Net sende week with

18 lbs

Net mass 33 lbs

18

